Despre CRP
Despre derivații de sulfoniluree
Despre ecografia abdominală
Despre raportul Ca urinar

Toate particularitățile hemogramei

Care e dieta la enterocolita acută

Despre rezistența bacteriilor la Cefort

Despre PEV glucoză 5% de 500 miliL, NaCl 5,85% de 10 miliL, KCl 7,45% de 10miliL, de Ca gluconic 10% de 10miliL

Despre Paduden

Despre Panadol

Despre Perfalgan

Despre acidul ascorbic

Despre Hepiflor

Despre Smecta

Scleroza amiotrofică laterală

Distrofia musculară; Paralizia cerebrală;

BPC-157

Agoniștii GLP-1

Despre Autism

Problema mare a telomerilor scurți este că te poți îmbolnăvi repede de bolile cardiovasculare. Dacă ai telomeri scurți atunci vei avea dislipidemie. Cu cât e mai scurt telomerul cu atât e șansa mai mare de-a avea cancer și multe alte boli sistemice. Un sistem imunitar bine întreținut este o protecție împotriva cancerului.

15 milimetrii e viteza de sedimentare a hematiilor la bătrâni.

Fe acaparează O_2
Fe se pierde ușor din organism.

Oxihemoglobină
Carboxihemoglobină

Când e montat șuntul în caz de hidrocefalie acesta trebuie să fie tare și valva să fie verificată periodic

Cel neoplazic trecut prin citostatice are un facies galben spre gri.

Gravida nu trebuie să intre în camerele unde au fost folosite insecticide, verifică despre Piperonyl Butoxide

Pentru a studia acuratețea unui articol medical trebuie verificate foile de observație ce au fost folosite pentru redactarea studiului despre boala la care face referire respectivul articol.

Despre obligațiile asistentului medical în educația sanitară din afara unității medicale

Alergiile la undele ultraviolete se manifestă ca erupții la nivelul tegumentului. Fenomenele de tip dependent produc intoxicații și se caracterizează prin admministrarea substanței ce îi produce efecte negative. Pot apărea fenomene fizice și fenomene psihice din urma dependenței.

antialergice: acidul cromoglicic, Budesonid, Hidrocortizon, Efedrină, Nafazolină și Beclometazonă.

În alergii se produce un proces imunologic. O situație particulară mai este o reacție adversă apărută printr-un deficit de eliminare a medicamentului. Chiar dacă se administrează o doză corectă, pacientul va avea o problemă de supradozare în organism. Când se observă blocaj la eliminare atunci medicamentul rămâne în circulație. Doza trebuie individualizată. Reacțiile adverse sunt în funcție de gravitate. Așa se decide dacă se continuă tratamentul. reacțiile adverse minore nu necesită antidot sau terapie proprie, pacientul le poate tolera.

Metoda hemaglutinare Beth Vincent și Simonin

Sânge pe EDTA

De ce apare chistul sebaceu pe scalp ?

Despre Trisomnia 21

Cea mai longevivă inimă artificială a fost de aproape 4 ani

Operațiile pe ureche și dispozitivele cu telecomandă pentru oprirea/pornirea sunetului

Omega-7

De memorat forma și culoarea medicamentelor per os

150 de zile ca oul gândacului să devină adult

Lezarea măduvei spinării în zona cervicală determină modificarea poziției brațelor, acestea fiind încrucișate, mâinile aproape de stern și alipite